

 Laboratorio Dr. Rapela	Laboratorio Dr. RAPELA	A-ABA- TEC-001.01
	Indicaciones para pacientes: COPROCULTIVO – ESCHERICHIA COLI O157	Revisión: 4

RECOMENDACIONES:

- ✓ Suspender todo tratamiento antibiótico 72 horas antes de la toma de muestra, salvo expresa indicación médica.
- ✓ Se debe evitar el contacto de la materia fecal con la orina.

MATERIAL NECESARIO:

- Retirar en el laboratorio un **tubo con un hisopo y medio de transporte (gel)**.

TOMA DE MUESTRA:

Pacientes que NO controlan esfínteres:

- En pacientes que utilizan pañales, colocar el pañal al revés para evitar que absorba la deposición; inmediatamente después de la evacuación, **tomar una porción de materia fecal de la región perianal** con el hisopo que se le entregó en el laboratorio.
- Colocar el hisopo en el tubo, cuidando que la muestra quede dentro del gel y bien cerrada.
- **No deben remitirse pañales.**

Pacientes que controlan esfínteres:

- Defecar en un recipiente limpio y seco.
- Inmediatamente después de la deposición, tomar una porción de materia fecal con el hisopo que se le entregó en el laboratorio (si se observa presencia de: mucosidad, pus o sangre, seleccionar esas zonas).
- Colocar el hisopo en el tubo, cuidando que la muestra quede dentro del gel y bien cerrada.

NOTA:

En caso que le sea imposible acercarse al laboratorio a retirar el tubo con medio de transporte, puede defecar en un recipiente limpio y seco; Recoger una porción de materia fecal en un recipiente estéril de boca ancha, **sin ningún tipo de conservante**, y remitir al laboratorio dentro de las 2 hs de recolectada la muestra. **Este recipiente NO debe contener formol, porque interfiere con el estudio.**