

 Laboratorio Dr. Rapela	Laboratorio Dr. RAPELA	A-ABA- TEC-002.04
	Indicaciones para pacientes: PRIMER CHORRO MICCIONAL	Revisión: 1

MATERIAL NECESARIO:

- Un frasco de plástico estéril, sin conservantes. No se aceptaran frascos de vidrio.

RECOMENDACIONES:

- Suspender todo tratamiento antibiótico 72hs antes de la toma de la muestra, salvo expresa indicación médica.
- Higienizar los genitales con agua y jabón blanco, a continuación enjuagar con abundante agua, y secar con toalla limpia.
- Hombres: Retraer el prepucio e higienizar el glande y surco balanoprepucial con agua y jabón blanco. Secar con toalla limpia.
- Se desaconseja el uso de antisépticos, ya que pueden afectar el resultado del cultivo.

TOMA DE MUESTRA:

- Recolectar en un **frasco estéril** la primera orina de la mañana, o con una retención mínima de 3 horas; **recolectar sólo la primera porción de la orina, unos 5 a 10 ml** (aproximadamente el volumen de una cucharada de sopa). No recolectar una cantidad mayor de orina!!!

CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE:

- Conservar a temperatura ambiente y entregar en el laboratorio dentro de las 2 horas de recolectada la muestra.